

Aumento de VIH en Chile: un problema multifactorial

Febrero 2019

Recientemente se ha hecho público el número de nuevos casos de VIH en nuestro país. Tal como se esperaba, superaría la cifra del 2017. Desde el año 2010, los casos han ido en aumento, siendo 2968 casos el 2010; 4385 el 2013; 4927 el 2017 y 6948 a diciembre de 2018. Como profesionales de la salud que atendemos a pacientes portadores de VIH, vemos que este incremento, que viene ocurriendo desde hace al menos 10 años, no puede ser explicado sólo por un factor, sino que se debe a múltiples causas, pero en especial: falta de educación sexual en Chile desde la infancia y con ello desconocimiento de las formas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, pérdida del miedo a esta enfermedad al saber que se trata de una enfermedad crónica que tiene tratamiento efectivo, cambios en las conductas sexuales de nuestros jóvenes, migración, entre otros.

Es importante aclarar que la mayoría de los nuevos casos de VIH se han presentado en personas de nacionalidad chilena. En los últimos años se ha visto un aumento en la proporción de nuevos casos de extranjeros (el 2015 un 9.19% de los casos correspondía a extranjeros; el 2016 un 16.18%; el 2017 un 25.34% y el 2018 un 37.13%). Desconocemos en qué porcentaje de los nuevos casos diagnosticados en Chile correspondientes a migrantes ya tenían su diagnóstico antes de llegar al país y quienes se infectaron en Chile. Sin embargo, sigue siendo la población chilena la que más aporta a los nuevos casos (más de 60%).

Por eso insistimos en que es fundamental enfocarnos como país en la prevención de la infección por VIH incentivando desde la infancia la educación sobre sexualidad saludable y medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, aumentar y ampliar las campañas de información y prevención en adolescentes y adultos, además de incentivar el uso del preservativo masculino y femenino facilitando su acceso. Disponer de estrategias como la Profilaxis Pre exposición en los grupos de mayor riesgo. Otra medida imprescindible es ir en la búsqueda de los infectados que aún no conocen su diagnóstico, de manera de iniciar tratamiento adecuado y de esta forma evitar la transmisión a terceros. Esto ya se está realizando mediante la aplicación de test rápidos de VIH distribuidos actualmente a lo largo de todo el país en los centros de atención primaria además de sitios claves como universidades, playas, plazas, entre otros.

En la medida que se continúe intensificando la pesquisa, es posible que sigamos viendo nuevos casos, pero la tendencia con los años deberá ser el de aplanamiento de la curva para luego disminuir los casos nuevos, con el plan de lograr el objetivo de la OMS de llegar a tener diagnosticados al menos el 90% de quienes tienen el virus y posteriormente lograr la eliminación de nuevos casos de VIH.

Comité Consultivo de SIDA (CCSIDA)

Sociedad Chilena de Infectología